

# Calendrier de vaccination

## Vaccination systématique pour les nourrissons et les enfants

ÂGE	VACCIN
2 mois	<b>DCaT-VPTI-Hib</b> (Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite, <i>Haemophilus influenzae</i> de type b) <b>Hép. b</b> (Hépatite b) <b>PC</b> (Pneumocoque conjugué) <b>Men-C-C</b> (Méningocoque C conjugué)
4 mois	<b>DCaT-VPTI-Hib</b> (Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite, <i>Haemophilus influenzae</i> de type b) <b>PC</b> (Pneumocoque conjugué) <b>Hép. b</b> (Hépatite b)
6 mois	<b>DCaT-VPTI-Hib</b> (Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite, <i>Haemophilus influenzae</i> de type b) <b>PC</b> (Pneumocoque conjugué) <b>Men-C-C</b> (Méningocoque C conjugué)
12 mois	<b>RRO</b> (Rougeole, rubéole, oreillons) <b>Hép. b</b> (Hépatite b) <b>VAR</b> (Varicelle)
18 mois	<b>DCaT-VPTI-Hib</b> (Diphtérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite, <i>Haemophilus influenzae</i> de type b) <b>PC</b> (Pneumocoque conjugué) <b>RRO</b> (Rougeole, rubéole, oreillons)
4-6 ans	<b>DCaT-VPTI</b> (Diphthérie, tétanos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite)
14-16 ans	<b>DCaT</b> (Diphthérie, tétanos, coqueluche (acellulaire)) <b>Men-C-C</b> (Méningocoque C conjugué)

Les effets indésirables fréquemment associés à la vaccination sont notamment : sensibilité accrue et rougeurs au site d'injection, humeur maussade, légère fièvre. Si votre enfant présente des symptômes plus graves, veuillez consulter votre médecin et signaler toute réaction grave aux infirmières en santé communautaire du Centre de santé de Whitehorse. Si vous habitez à l'extérieur de Whitehorse, veuillez signaler toute réaction grave à l'infirmière praticienne de votre localité.

### CENTRE DE SANTÉ DE WHITEHORSE

9010 Quartz Road • 867-667-8864

#### SUR RENDEZ-VOUS

mardi et jeudi : de 9 h à 11 h 15  
lundi, jeudi et vendredi : de 13 h à 15 h 15

#### CLINIQUE DES VOYAGEURS

Sur rendez-vous seulement — veuillez prendre rendez-vous de 6 à 8 semaines avant la date de départ.

#### CLINIQUE DE SANTÉ DES ADULTES

Clinique de vaccination — du lundi au vendredi : de 8 h à 8 h 30 et de 15 h à 16 h  
*Recommandée pour : vaccination de rappel pour les voyageurs, vaccin contre l'influenza, vaccin contre la diphtérie et le tétanos, dépistage de la tuberculose (lundi, mardi et mercredi).*

**Consultez votre fournisseur de soins de santé si les effets indésirables persistent après 48 heures.**  
**Pour de plus amples renseignements sur les vaccins, visitez le site : <http://www.hss.gov.yk.ca/>**

#### SANS RENDEZ-VOUS

samedi (*sauf longs week-ends*) : 10 h à midi  
Vaccination de rattrapage pour nourrissons et enfants seulement.

#### MESURE DU POIDS ET DE LA TAILLE, SANS RENDEZ-VOUS

(Aucun vaccin ne sera administré)  
mercredi : de 13 h à 15 h

Mars 2008 — Programme mis sur pied le 1<sup>er</sup> janvier 2007.